

# 常見有毒中草藥介紹

中國醫藥大學藥學系藥用植物學科

黃世勳 助理教授

[sshuang@mail.cmu.edu.tw](mailto:sshuang@mail.cmu.edu.tw)

(0922)629390

中華藥用植物學會 創會理事長

台中市藥用植物研究會 第16屆理事長

熱門話題: 預算案·相集: 鍾嘉欣著裙褂·奧斯卡全部得獎名單·【有歌聽】鍾嘉欣唱《我結婚了》·美女廚神結婚·

港聞 港聞二

2014年4月12日 星期六

有毒植物當人參 婦沖水飲中毒

← 上一篇 下一篇 →

## 有毒植物當人參 婦沖水飲中毒



【明報專訊】居於元朗的40歲女子，上月30日用自行種植的「美洲商陸」根部用熱水沖泡，飲用後約兩小時出現嘔吐，同日到博愛醫院急症室求醫，留醫兩天後於本月1日出院。衛生防護中心初步調查發現，女病人誤以為美洲商陸是人參，沖水飲用後懷疑中毒。中心發言人提醒，美洲商陸的鮮根部外表酷似人參，但前者含毒性，並不建議食用。




一名女子誤以為自行種植的「美洲商陸」（圖）是人參，以其鮮根部泡熱水飲用後疑中毒入院。（政府新聞處圖片）


「美洲商陸」根部有毒

衛生防護中心指出，尚在調查女病人懷疑中毒的個案，已向該名女病人作出衛生建議。中心又提醒市民，進食美洲商陸的鮮根部可能引致惡心、嘔吐、腹瀉和肚痛等病徵，市民應避免採摘或進食，以免中毒；一旦誤服美洲商陸或出現中毒病徵，應該立即求醫。

### 香港新聞



### 野生人參非「人參」，是「商陸」



# 何謂有毒植物？

◎有毒植物是指某種植物對人類或家畜造成某種的傷害，如死亡或某些組織器官等暫時性至長期性的傷害。

◎部分常見的園藝植物對人會產生致命的傷害，尤其對兒童最具危險性。許多有毒植物如果食用相當大量時，是會產生毒性(雖然不至於死亡)。這些植物之葉片、花、果實或種子具有誘人色澤，嚐起來，因味道不可口，誤食者通常會立刻將其吐出；或因誤食時，口腔會產生類似灼燒般的疼痛，而將其吐出，除此之外尚會使吞食者產生過敏的現象，由於以上的情況，所以通常吞食不致過量時，對生命不會發生危害。

# 有毒植物中毒途徑

## ◎因食用或藥用而中毒

某些藥用植物（如杏仁、毛地黃），若食用過量，或無意中利用有毒植物當材料來用（如以夾竹桃當筷子），很容易造成中毒現象。

## ◎因吸入而中毒

如白千層花粉，人吸入後，常造成呼吸道不適，夾竹桃燃燒後所產生之氣體，也很容易造成中毒現象。

## ◎因接觸而中毒

有許多植物（如漆樹）之汁液碰觸到人體後，往往會造成紅腫或潰爛現象。

# 如何判斷有毒植物

- ◎先採一小片置於舌尖，如有麻辣或強烈之辛味者，最好不要食用。
- ◎手摸會癢者。
- ◎有乳汁的植物(除了您熟悉的桑科、菊科等成員外)，很多種類或多或少具有毒性，在確認之前，不要隨便採食。
- ◎野鼠、松鼠、鼯鼠、鳥類或其他哺乳動物食用的野生蔬菜水果，通常我們人類也可以食用。
- ◎菜蟲吃的植物，亦可食用。



●菜蟲





具白色乳汁



## 海檬果 (海芒果)

科名：夾竹桃科

有毒部位：全株，果實和果仁的毒性最強。

中毒症狀：噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、手腳麻木、冒冷汗、血壓下降、呼吸困難、心跳停止等。

(註)：海檬果的毒素為強心配糖體，主要存在於果實之中(有文獻指出吃半個果仁，即可致死)



# 借鏡國外 提升台灣

訂做好爸爸 社會住宅是好宅 騎向單車大城

udn / 地方新聞 / 基宜花東

熱門關鍵字：大學落點 | 報馬仔 | 七夕必備 | NEWS零時差

- 即時新聞
- 影音多媒體
- 國內要聞
- 社會新聞
- 地方新聞
- 兩岸台商
- 全球觀察
- 意見評論
- 財經產業
- 股市投資
- 基金理財
- 運動大聯盟
- 數位資訊
- 娛樂追星
- 消費流行
- 時尚名人
- 生活天氣
- 健康醫藥

最新 | 發燒 | 哇新聞 | 字級：A A A A

請選擇--<基宜花東>相關新聞

## 海欖果有毒 193縣道沿路清除

【聯合報 / 記者劉時均 / 新報報導】

2011.07.12 03:02 am

外型 and 土芒果相似的海欖果，原是海岸邊的防風林種，但全株有神經毒，花蓮縣新城鄉調解委員林國賢擔心民眾誤食，讓南投中毒意外在花蓮發生，昨聯絡岸巡八三大隊、林管處新城工作站和新城鄉清潔隊員沿193縣道清除。



岸巡八三大隊昨天上午沿著193縣道清除路邊的海欖果，避免民眾誤食。  
記者劉時均 / 攝影

生長在海岸邊的海欖果，果實未成熟時像土芒果，成熟時像文芒果，因能抵抗海邊強盛且帶鹽分的海風，成為常見的防風林樹種，但內含的汁液有神經毒，不小心滴入眼中有可能會造成失明，誤食將導致上吐下瀉、虛脫，尤其種子的核仁會快速刺激心臟纖維顫動，引發噁心、嘔吐、冒冷汗，造成心臟衰竭死亡。



- 生活天氣
- 健康醫藥
- 旅遊休閒
- 校園博覽會
- 閱讀藝文
- 聯合書報攤
- udn shopping
- 數位閱讀
- 進修線上
- 職場行家

udn推薦



2011 聯合報夏令營 即日起開始報名

熱銷排行



有可能會造成失明，誤食將導致上吐下瀉、虛脫，尤其種子的核仁會快速刺激心臟纖維顫動，引發噁心、嘔吐、冒冷汗，造成心臟衰竭死亡。

林國賢指出，這陣子南投縣民眾疑似誤食馬錢子而中毒死亡，而新城鄉加灣到七星潭靠近海岸邊，多年前龍王颱風襲台時，林管處曾種植數十棵海欖果作為防風林種，最近已開始開花結果，但許多外地民眾不知道這是有毒的植物，且193縣道是單車客喜愛的路線之一，即使誤觸汁液都會讓人不適，這次才會聯絡相關單位幫忙清除。



海欖果全株有神經毒。  
記者劉時均 / 攝影

花蓮林管處新城工作站為避免民眾誤食，特別在路旁設牌介紹海欖果特性，提醒民眾別因好奇摘採。

岸巡八三大隊這次也特別出動22名弟兄幫忙清除沿線海欖果，中尉黃啟信表示，除上平時就會進行周圍環境清掃，希望能達到敦親睦鄰的目標，共同守護環境。

【2011/07/12 聯合報】 @ http://udn.com/

訂閱電

請輸入

- udn
- udn
- udn
- udn
- udn
- udn
- 台灣
- 臺北

# 新聞剪輯

2006年12月9日：連吞三顆海欖果，險上西天。(自由時報)

台北榮總日前輾轉接獲一位病患吞下有毒的海欖果企圖自殺，病患共吞下3顆海欖果，到院時，心跳每分鐘只剩下22下（正常人約為60至80下），過去國內曾發生誤食一、兩顆海欖果中毒的案例，刻意吞下毒果自殺，還是頭一次碰到。台北榮總毒物科主治醫師楊振昌指出，這名自殺的病患摘了3顆海欖果的果實剝開後吞下肚，結果立即出現臉麻、上肢麻、胸悶、噁心、嘔吐、幻覺及心跳減慢的中毒症狀，由於痛苦難耐，自己跑到醫院就醫。



## 黃花夾竹桃

科名：夾竹桃科  
有毒部位：全株。  
中毒症狀：舌頭有灼痛及麻木之感，接著喉嚨乾燥、刺痛，中毒的情形是噁心、嘔吐、腹瀉、昏睡、瞳孔放大、血壓升高，心跳變慢且不規則，隨即心臟阻塞。






## 夾竹桃

科名：夾竹桃科  
有毒部位：全株。  
中毒症狀：噁心、嘔吐、  
腹部抽筋、暈眩、昏睡、  
脈博微弱、**心律不整**、瞳  
孔放大、瀉血、痙攣、呼  
吸系統麻痺、失去知覺、  
死亡。

具白色乳汁



# 2006年新聞(夾竹桃的致死人數最多)

植物中毒調查夾竹桃最要命 - Windows Internet Explorer

http://www.epochtimes.com/b5/6/10/11/m1482940.htm

File Edit View Favorites Tools Help

Windows Live 夾竹桃中毒 筷子 好友動向 個人檔案 郵件 相片 行事曆 MSN 分享 登入

Favorites 賽爾號繁體版 亞洲第...

植物中毒調查夾竹桃最要命

新聞主頁 北美新聞 台灣新聞 港澳新聞 大陸新聞 國際新聞 科技新聞 財經消息 台灣地方新聞 社會新聞

### 植物中毒調查夾竹桃最要命



【大紀元10月11日訊】(自由時報記者胡清暉／台北報導)國內研究指出,曼陀羅、毒菇是民眾最常誤食中毒的植物類別,夾竹桃的致死人數較多。值得注意的是,中毒植物榜上有名的曼陀羅、八角蓮、日日春,都具有藥用價值,或常被當成偏方。醫師提醒,民眾有病要求診,不要自行摘採、食用,導致服用過量中毒。

高醫大附設醫院急診內科主任林增記日前發表「植物中毒概論」的報告,統計近10年內國內植物中毒病例。資料顯示,在902名病例中,有36人死亡,其中有6人是死於含有強心甙體成分的夾竹桃。林增記指出,夾竹桃常見於庭園、鄉間和行道樹,有民眾隨手取其枝幹當

成筷子,卻因其汁液流出導致中毒。

環境藏危險「食」在要小心

林增記分析,植物中毒的主要原因是誤採、誤食。以最常中毒的曼陀羅而言,形似喇叭花、百合花,全株有毒,以果實及種子毒性最大,卻有民眾摘採當成野菜炒來吃,導致中毒,也有人故意拿來當做迷幻藥使用。有民眾到山區摘採菇類,誤摘毒綠褶菇等毒菇,或有學校種植油桐樹,果實隨風落地,被學生撿拾食用,都發生上吐下瀉的案例。

有不少常見有毒植物被用來當成中藥、偏方。例如,曼陀羅花粉被部分科學中藥拿來治氣喘,也有類風濕關節炎的患者把曼陀羅當成止痛偏方,卻因不當服用劑量而導致中毒。

北榮急診部主治醫師高偉峰則指出,八角蓮具有抗癌作用,有偏方把八角蓮的根部入藥,結果有民眾吃了後一年無法走路,10年後仍有末梢神經異常,甚至有肝病病人服用後,腸胃道嚴重出血。坊間也有人把日日春當成是抗癌偏方,在未經醫師指示下,自行服用,卻因劑量不正確導致骨髓抑制。

另外,八角蓮、黃金葛、日日春都可作為觀景用的盆栽。林增記提醒,要小心不要誤食,且黃金葛若枝葉折斷流出汁液,人體不慎接觸會造成皮膚紅腫。



Internet 100%


開始 2010... Adobe... 犁頭... 福順... Micros... 012... 植物... 012... 路邊... A | 上午 07:26

# 馬茶花



具白色乳汁

科名：夾竹桃科  
有毒部位：全株。  
中毒症狀：誤食枝葉或  
花朵，引起嘔吐、腹痛、  
腹瀉等症狀。



具白色乳汁



## 小花黃蟬

科名：夾竹桃科

有毒部位：全株。

中毒症狀：誤食造成嘔吐、  
腹瀉、發燒、噁心、嘴唇  
紅腫、心跳加快、循環系  
統障礙等。

# 軟枝黃蟬



具白色乳汁

葉輪生



# 馬利筋

科名：蘿藦科  
有毒部位：全株，乳汁的毒性最強。  
中毒症狀：誤食乳汁引起虛弱、腫脹、無法站立或行走，發高燒、**脈搏加速但微弱**，呼吸困難、瞳孔放大等。

具白色乳汁





(樺斑蝶)幼蟲以蘿藦科植物為食，最喜歡馬利筋。由於馬利筋有毒，這些毒性留在樺斑蝶幼蟲體內，使小鳥吃後會不舒服。幼蟲身體呈黑黃相間的警戒色，有六根黑色肉刺，三齡後肉刺基部紅色。





## 鳳凰木

科名：豆科

有毒部位：花及種子。

中毒症狀：誤食種子中毒後有頭暈、流口水、

腹脹、下痢等症狀。莖

皮的抽出物對家畜有催吐作用和中樞神經的抑

制作用。



## 苦楝(諧音/可憐)

科名：楝科

有毒部位：根、莖皮及成熟果實。

中毒症狀：噁心、嘔吐、劇烈腹痛、下痢、頭痛、昏睡、全身無力、體溫上升、瞳孔放大、抽搐、發抖、血壓下降、最後因為呼吸麻痺而死亡。



# 白千層



科名：桃金娘科  
有毒部位：花粉。  
中毒症狀：敏感者吸入花粉，往往造成呼吸道過敏，猛打噴嚏、頭痛，噁心、氣喘等，有時臉部會出現小紅疹。



# 孔雀椰子

科名：棕櫚科

有毒部位：果肉及果汁。

中毒症狀：誤食果肉引起腸胃發炎；誤觸果汁造成皮膚發癢及發炎。



常被誤認成檳榔



## 福祿桐

科名：五加科

有毒部位：汁液。

中毒症狀：接觸其汁液，可能引發紅疹；碰到口部時，有時會引起腫痛而無法吞嚥。





## 杜鵑花

科名：杜鵑花科

有毒部位：全株。

中毒症狀：誤食會產生噁心、嘔吐、血壓下降、呼吸抑制昏迷及腹瀉等症狀。



## 變葉木

科名：大戟科

有毒部位：汁液。

中毒症狀：誤食汁液，有腹痛及腹瀉等症狀。





具白色乳汁



## 烏柏

科名：大戟科

有毒部位：木材、乳汁及葉片。

中毒症狀：誤食有腹痛、腹瀉、腹鳴、頭昏、四肢及口舌麻木、耳鳴、面色蒼白、四肢發冷等症狀。皮膚過敏者接觸乳汁會引起紅腫、糜爛等。





具白色乳汁



## 金剛纂 (火巷、火烘)


科名：大戟科

有毒部位：莖葉及乳汁。

中毒症狀：乳汁中的樹脂接觸到皮膚後造成發炎、起泡、接觸眼睛會劇痛甚至失明；誤食少量時引起劇烈下瀉、腹痛，大量則刺激口腔黏膜，引起嘔吐、頭暈、昏迷、肌肉顫動等症狀。



具白色乳汁




## 聖誕紅(猩猩木)

科名：大戟科

有毒部位：全株。

中毒症狀：乳汁會引起皮膚紅腫發炎，對眼睛亦有相當的毒害。孩童吸食莖部或嚼食葉子、花蕾、苞片等，會引起喉頭燒痛乃至嘔吐、腹瀉等。



# 猩猩草



具白色乳汁



## 麒麟花

科名：大戟科

有毒部位：全株。

中毒症狀：誤食引起口部、喉部、及胃部不適，嚴重時有嘔吐，腹瀉及衰弱等現象。



具白色乳汁




# 曼陀羅類

科名：茄科

有毒部位：全株。

中毒症狀：出現**抗乙酰膽鹼**中毒症狀，如：(1)**中樞神經症狀**：發熱、躁動不安、焦慮、譫妄、視幻覺、運動失調、眼球震顫、肌肉抽搐、痙攣、定向力缺失、健忘、無法言語、精神混亂、嗜睡，甚至昏迷。(2)**週邊神經症狀**：血管擴張、皮膚泛紅、皮膚發乾、氣管分泌減少、**口乾舌燥**、腹脹、便秘、解尿困難、**瞳孔放大**、**心跳加快**、血壓上升或下降。(3)**一般食後0.5~2小時出現症狀**，可能為**口咽發乾**、**吞咽困難**、**聲嘶**、**脈快**、**瞳孔放大**、**皮膚乾燥潮紅**、**發燒**等。**食後2~6小時**可能出現**譫妄**、**幻覺**、**躁動**、**抽搐**、**意識障礙**等精神症狀。嚴重者常於**12~24小時**出現**昏睡**、**呼吸淺慢**、**血壓下降**，以至發生**休克**、**昏迷**及**呼吸麻痺**等。



# 2002年12月13日新聞(治咳嗽 誤食曼陀羅花中毒)



設為首頁

TVBS

TVBS新聞台

TVBS歡樂台

TVBS-Asia

G Club

Blog

Mobile

TVBS周刊

TVBS基金會

搜尋TVBS-N新聞

查詢

熱門指數:93 友善列印 寄給好友

小中大特

TVBS新聞自律  
規範

TVBS民調

SNS

焦點專題

影音專區

台灣政治

台灣社會

台灣生活

財經新聞

兩岸三地

世界新聞

科技新奇

影視娛樂

體壇脈動

系列專題

內部消息

新聞Q&A

更正與澄清

每日新聞總表

熱門新聞排行

20大熱門索引

十大頭條

## 治咳嗽 一家3口誤食曼陀羅花中毒

記者:洪麗萍 羅樹明 台北 報導



天氣變化大，民眾感冒咳嗽不停，有民眾要買草藥「曇花」治咳嗽，卻誤買「曼陀羅花」，吃了後中毒，還差點送命。林口長庚醫院近三月來就接獲5起病例，還有一家三人吃了曼陀羅花，十幾分鐘就發病，緊急送進加護病房。

台語稱作「瓊花」的曇花，民間偏方號稱加冰糖煮開，可以治氣喘、久咳不止，草藥店就有得賣；這種曬乾的曼陀羅花，含有劇毒，吃下肚不到半小時就會出現意識模糊、頭暈心悸、噁心嘔吐、瞳孔放大等症狀，林小姐全家感冒，買曇花煮開治咳嗽，沒想到誤買曼陀羅花。

光是過去三個月，林口長庚接獲五起曼陀羅花中毒案件，醫師表示，曼陀羅花在中北部山區常見，模樣和曇花完全不一樣，一名62歲婦人朋友好心送新鮮曇花治咳嗽，喝了半碗就發病，經過比對，才知道同樣也是劇毒的大花曼陀羅。

醫師說，現在有許多草藥店都有賣曼陀羅花，但店家對毒性卻不甚了解，除了呼籲民眾提高警覺，也建議衛生署加強草藥店管理，以免中毒事件再度發生。



報名時間：  
即日起~7/29(五)  
活動日期：  
8/6(六)上午9:30  
至下午4:00

## 新聞剪輯

2012年3月29日：摘曼陀羅煮蛋花湯，3人下肚神經中毒。

苗栗縣苑裡鎮彭姓鄰長(男性)採摘自宅前栽種的大花曼陀羅花苞，加香菇頭煮蛋花湯和2名友人一起食用，結果引發神經性中毒，送醫時3人皆已呈現「譫妄症」現象，神智不清、心跳加速且瞳孔放大，醫師緊急施打副交感神經抑制劑之「拮抗劑」才撿回性命。其中彭先生和劉小姐分別喝了2碗，症狀較嚴重；負責烹調的王小姐將湯汁摻入飯裡食用，症狀較輕。(王小姐表示食用後沒多久，開始覺得全身暈眩、四肢無力。她說「只知道以前曾經吃過，沒甚麼事」)

## 2006年3月17日：聽信草藥可治癌？夫婦誤食大花曼陀羅中毒。

台中縣一對夫妻，因太太罹癌，而聽信朋友介紹某種草藥可治療癌症，先生便取該藥草兩根(大約都12~15公分)，加里肌肉煮來吃，由於湯頭不錯，自己也就喝了兩碗，老婆也喝了一碗半，不料喝完5分鐘後，兩人就出現頭昏目眩、臉色發白等現象，陳先生的瞳孔也有放大情形，家人緊急將他們送到童綜合醫院急診室，醫師將家人所帶來的草藥進行比對，發現患者是誤食「大花曼陀羅」引起中毒。(醫師表示由於家人將他們所吃的藥草一併帶到醫院，所以很快就可找出病因)



**2004年5月14日：採錯藥！母子誤服曼陀羅中毒送醫。**

宜蘭40多歲的高先生，充滿孝心上山採草藥，熬湯給70多歲的老媽媽喝，不料卻誤採到有毒的「曼陀羅」，兩人喝了險些送命，幸好及時送醫母子兩人才撿回小命。【高先生說吃這個喉嚨很乾燥，快要束起來...(台語)】

**2002年12月13日：曼陀羅花誤作曇花，兩童誤食昏迷。**

楊梅有一家人因為小孩久咳不癒，媽媽就嘗試用傳統療法「曇花煮冰糖」，沒想到兩個孩子各喝1碗，不到半小時就意識不清，連窗簾都看成爸爸，才知道原來草藥店賣的不是曇花，而是有強毒性的曼陀羅花。

# 也是給錯藥？ 買曇花買到曼陀羅花 多人中毒

2002年12月13日 18:21

0 0

f 分享

+1 f 讚 + 分享 | P t P

記者馬心婷、黃德武／台北報導

最近連續傳出給錯藥、打錯針的醫療疏失，但有人上草藥店買中草藥，也傳出險些送命的事件。因為有民眾誤用偏方曼陀羅花治療咳嗽，結果一家五口竟有三人中毒，差一點送命。

俗稱「瓊花」的乾燥的曇花，性微寒，味甘淡，被認為有清肺、止咳化痰功效，長期以來是民間用來治療咳嗽的偏方，而劇毒的曼陀羅花吃一點點，就會中毒，甚至喪命。桃園一家人就是因為買曇花想治療感冒咳嗽，沒想到卻買到曼陀花，結果，一家五口中有三人中毒送入加護病房。



▶ 播放影音

草藥店曼陀羅當曇花賣 一家三人險送命

▶ 播放影音新聞

98.06.23 蘋果日報 A13 健康

## 藥酒含曼陀羅 婦中毒幾盲



曼陀羅有劇毒性，食用後嚴重會意識喪失甚至喪命。 資料照片

一名婦人因失眠而喝下朋友推薦的藥酒，飲一小口即昏沉入睡，隔天起床卻噁心虛弱，視力從近一點驟降為零點零五，就醫發現藥酒含有曼陀羅。林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑說，曼陀羅根、莖、葉、花都有毒，不應亂喝藥酒，服用中草藥材前應先諮詢醫師。

日前接獲個案的彰化基督教醫院眼科主治醫師邱欣玲說，婦人中毒的量不大，補充水分、稀釋體內濃度後逐漸康復。她表示，曼陀羅有劇毒性，近代已不用於人體；曼陀羅中毒輕則口乾舌燥、心跳呼吸急促、頭暈欲睡，嚴重會產生幻覺、意識喪失甚至喪命。

記者甯瑋瑜

# 顧氣管之藥草(無毒)

## 曇花



# 顧氣管之藥草(無毒)



霸王花(火龍果)





## 南非葉

科名：菊科

藥用部位：全株或葉。

中毒症狀：過量可能導致  
猛爆性肝炎。





## 金露花

科名：馬鞭草科

有毒部位：果實。

中毒症狀：誤食會造成腹痛、腹瀉、昏昏欲睡、發燒、痙攣等症狀。





## 馬纓丹

科名：馬鞭草科  
有毒部位：枝葉及未成熟果實。  
中毒症狀：誤食會造成慢性肝中毒、有腹瀉、發燒、衰弱、嘔吐、步履不穩、呼吸急促、昏迷、黃疸等症狀。

攝影(比賽)好題材

乳黃馬纓丹(栽培種)



花色多變化，栽培容易  
俗稱五色梅、珊瑚球等

黃馬纓丹(栽培種)



橙紅馬纓丹(變種)







## 西洋白花菜

科名：白花菜科

有毒部位：全株。

中毒症狀：食用多量之莖葉，引起視覺模糊，四肢無力、頭痛、頭暈、瞳孔中度放大、對光反射遲頓等症狀，嚴重者在1~2日後完全失明、癱瘓等。





## 粗肋草

科名：天南星科

有毒部位：全株。

中毒症狀：誤食莖葉會造成口舌發炎、腹瀉、胃痛等症狀。

## 黃金葛

科名：天南星科

有毒部位：汁液。

中毒症狀：汁液經常引起皮膚炎；如接觸到口部，會造成嘴唇紅腫，甚至腹瀉等症狀。



## 海芋

科名：天南星科

有毒部位：塊莖、佛焰苞及肉穗花序。

中毒症狀：咀嚼一小塊塊莖後即可引起喉部腫痛及嘴部麻醉。

## 姑婆芋

科名：天南星科

有毒部位：汁液。

中毒症狀：誤食易引起口部、喉部及胃部灼痛。



新聞

動新聞

即時新聞

今日總覽

昔日新聞

基金會



每日團購



犁頭草整株含葉子(右圖)都有毒,其中塊莖(左圖)毒性最強。楊振昌醫師提供

頭條要聞 > 誤信吃犁頭草防癌 男昏迷

點閱(7988)

轉寄(1)

引用(3)

字級: A A A 分享: [Icons]

### 誤信吃犁頭草防癌 男昏迷 毒性強 無藥可治 恐致胃糜爛

2009年 07月31日

【高麗玲/台北報導】民間流傳吃犁頭草可防癌、治骨刺、痛風，一名男子吞食犁頭草防癌，結果才吃了幾片，竟然發生胡言亂語、甚至昏迷，類似腦炎的症狀。醫師表示，近日陸續收治吃犁頭草吃到喉嚨、胃糜爛的患者，由於犁頭草是毒性很強的青草藥，會造成神經毒，而且目前無解毒劑，民眾千萬不要食用。

見青即是藥 藥即是毒



### 即時新聞

台南製糖業大爆 沖繩黑砂糖他們做的

父子同命 相隔48年都被雷劈死

《哈你》KUSO大會串 網友瘋創意

20:19 獨家! 警局



長庚醫院腦神經內科系癲癇科主任吳禹利說，該男子可以防癌，就一起吃犁頭草，但嚼食後只有他吞下吐掉，結果這名男子才吃幾天、數片葉子，人就開始胡言亂語、昏迷，出現中樞神經毒的症狀。這些症狀沒藥可治，當時只能觀察及給予支持性療法，一個月後恢復正常。



老仔阿呷

## 犁頭草治百病？感冒變中風

2010/03/23

【聯合報／記者彭芸芳／新竹報導】

很多人自認做公益，發善念助印「犁頭草是治癌剋星」的傳單四處發送，新竹市一名50多歲的男子看了傳單，用犁頭草加香蕉打汁喝，結果喝了2天就因頭暈不能走路送急診，醫生疑他中風，他住院忍了多天才吐實，原來是犁頭草中毒。

只要到廟前樹下就常可看到有人發送這種傳單，網路上也可查到數十萬筆的相關謠傳，有

人見證吃了癌症就痊癒，有人說骨刺、痛風都好了，像上述這名男子拿到的傳單，上面寫「仙丹可以治百病，神奇無比，治癌會好，請大家一起做善事」，結果沒病，卻吃出病來。

署立新竹醫院神經科醫師蔡佩君表示，這名男子到院時，全身無力、頭暈、無法下床走路，當時懷疑他中風而住院檢查，但是住院治療一週後，雖略有改善，始終還是頭暈，查不出毛病。



這就是犁頭草，民間盛傳吃了可治癌症等各種病痛的青草藥。  
(記者彭芸芳／攝影)

## 咬人貓



科名：蕁麻科

有毒部位：全株各部位之  
焮毛。

中毒症狀：人的皮膚若觸  
及焮毛，有立即的刺痛或  
灼痛感，十分難受，大約  
要半日後才逐漸恢復。

解毒：用**姑婆芋**的葉子搗  
碎、或鹼性的肥皂水、尿  
液來酸鹼中和，就可以解  
毒、消腫止癢。



蠍子草

解藥 / 姑婆芋



咬人狗

常見有毒植物



分類：大戟科
學名：Euphorbia tirucalli L.
有毒部位：乳汁
中毒症狀：乳汁刺激性强，可作毒劑或毒劑，接觸皮膚會引起發癢、瘙癢、起紅腫、甚至起膿瘡...



分類：大戟科
學名：Ricinus communis L.
有毒部位：全株有毒，種子毒性最大
中毒症狀：潛伏期較長，誤食後3-24小時發病...



分類：夾竹桃科
學名：Plumiera tubra L. var. acutifolia
有毒部位：全株，以乳汁最毒
中毒症狀：誤食可能引起嘔吐、腹瀉、發燒、頭暈、腦痛、紅腫、心跳加速等...



分類：大戟科
學名：Euphorbia milii Ch. des Moulins
有毒部位：全株，以乳汁最毒
中毒症狀：誤食可能引起口部、喉部及胃部不適...

其他有毒植物的中毒反應

Table with columns: 植物名 科名 有毒部位 中毒反應. Lists various plants like 山馬茶, 沙漠靈, 嗎刺, etc.

Table with columns: 植物名 科名 有毒部位 中毒反應. Lists various plants like 假玉桂, 西番蓮, 粗節草, etc.

系主任在與師生生命合影



常見有毒植物介紹



- 本系沿革
本系於民國47年本校創口之時成立...
本系設立宗旨
推廣中醫藥兩大系統...
本系辦學特色
推廣中醫藥兩大系統...
本系教育目標
學生班：建立本系系統性知識與專業人才之建立...
本系前景與發展
本系在藥學教育上深具專業性...
本系聯絡地址、電話及聯絡人

中國醫藥大學藥學系 編印

系主任的話

本系以「推廣中醫藥之藥學專業人才」為宗旨，所以中藥相關課程教學更成為本系的特色教學之一...

何謂有毒植物?

有毒植物之指具有中毒劑，或經由實驗證明可能回致害、癱瘓或其他危害於人或、家畜其他動物(食性動物)的死亡...

如何初步判斷有毒植物?

當我們無法確認某種植物是否有毒時，建議可採下列方法初步辨別：(1)具白色乳汁的植物可能有毒...

有毒植物的分布

有毒植物無處不在，但以植物分類而言，主要分布於夾竹桃科、繡線科、百合科、石蒜科、天南星科、大戟科、漆樹科、杜鵑花科等...

常見有毒植物



分類：夾竹桃科
學名：Acantharthus roseus (L.) G. Don
有毒部位：全株
中毒症狀：潛伏期約3-6小時...



分類：夾竹桃科
學名：Catharanthus roseus (L.) G. Don
有毒部位：全株
中毒症狀：潛伏期約3-6小時...



分類：茄科
學名：Bruguiera suaveolens (Wild) Bercht. & Presl
有毒部位：全株有毒，尤其是種子及莖
中毒症狀：出現抗乙醯膽鹼中毒症狀...



分類：夾竹桃科
學名：Nerium indicum Mill.
有毒部位：全株，燃燒後之煙霧也會劇毒
中毒症狀：頭痛、暈車、頭暈、嘔吐...



分類：天南星科
學名：Atocacia macrorrhiza (L.) Schott & Endl.
有毒部位：全株有毒，尤其是種子及塊莖
中毒症狀：主要症狀一般認為是其所含草酸鈣...



分類：豆科
學名：Abusus precatorius L.
有毒部位：種子(含有毒蛋白)
中毒症狀：誤食後取耳鳴、嘔吐...



分類：夾竹桃科
學名：Cerbera manghas L.
有毒部位：全株，尤其果實、果仁毒性最強
中毒症狀：海康草的毒藥為強心甙...



分類：夾竹桃科
學名：Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.
有毒部位：全株含劇毒，種子比夾竹桃更毒
中毒症狀：嘔吐、腹痛、頭暈、嘔吐...



分類：夾竹桃科
學名：Allamanda nerifolia Hook.
有毒部位：全株，以乳汁最毒
中毒症狀：誤食可能引起嘔吐、瀉、發燒、頭暈、腦痛...



分類：天南星科
學名：Rhapidophora aurea (Lindl. ex Andre) Birdseye
有毒部位：汁液
中毒症狀：汁液經常引起皮膚炎...



# 中毒之治療原則

如果發現有誤食或觸摸有毒植物時，應儘速送醫並根據以下原則予以適當的治療：

## ◎一般治療

給誤食有毒植物者治療之原則，應以阻止或減慢毒素的吸收為首要目的，並立即設法除去毒素。所以其步驟為：清洗，催吐，洗胃，導瀉，灌腸，服用沉澱劑、吸清劑和保護劑，輸液排毒及加速排洩。

## ◎服用解毒劑

解毒劑的主要解毒原理是氧化或是中和毒素。

## ◎對症下藥

誤食有毒植物時，人體內各器官的功能往往發生嚴重的障礙，必須儘速處理（如注射強心劑，人工呼吸等等），才有復原的機會。

謝謝聆聽



敬祝 闔家平安